

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 26-4-76173139

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION "LANGUEDOC-ROUSSILLON"

(AUDE - GARD - HERAULT - LOZERE - PYRENEES ORIENTALES)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

MAISON DE L'AGRICULTURE - BAT. 5 - PLACE CHAPTAL
34076 MONTPELLIER CEDEX - TEL. 92.28.72

ABONNEMENT ANNUEL :

Régisseur de recettes de la D.D.A.
C.C.P. Montpellier 5238-57

50 francs

1976 - N° 14

VIGNE

MILDIOU

A la suite de la découverte des premiers foyers primaires à St Laurent d'Aigouze (Gard) il est recommandé de procéder d'urgence à la suppression des sagattes et, si possible, à l'évacuation des eaux stagnantes en vue d'éviter la formation des foyers de mildiou.

Dans la zone allant de Montpellier à la vallée du Rhône où les pluies ont été abondantes début avril (5 au 7 Avril) et à la mi-avril (16 au 19 avril) et dans les vignes soumises à la submersion contre le gel (basse vallée de l'Hérault et de l'Aude) la recherche de foyers primaires doit être menée rapidement.

Rappelons qu'à la suite de l'éradication des feuilles porteuses de taches, il doit être procédé à un traitement anti-mildiou de la parcelle.

PYRALE

Rappelons que la protection contre ce ravageur s'effectue dès l'observation d'une forte activité de ces chenilles. Les premières migrations ont été contrôlées.

On utilisera une spécialité à base de

caephate 75 g MA/HL methomyl 62,5 g MA/HL.

P 178

POIRIERS ET POMMIERS

TAVELURES

Le renouvellement du traitement est rendu nécessaire par les pluies du 15 au 19 avril et par le développement de la végétation.

Rappelons que le mélange soufre + produit à base de phtalimide (captane, phaltane, captafol) ne peut plus être utilisé sur les variétés rouges.

- que le captafol, employé sur golden, après floraison, provoque du russeting.

N.B. Après la floraison, recourir de préférence à l'emploi de fongicides de synthèse.

POMMIERS

OIDIUM

Une recrudescence de la maladie est constatée actuellement surtout dans les vergers non traités ou insuffisamment protégés.

Ajouter un anti-oidium, lors du traitement préconisé contre la Tavelure.

Seul un traitement abondant, allant jusqu'au ruissellement permet d'obtenir de bons résultats.

HOPLOCAMPES

Dans les vergers habituellement attaqués, un traitement est recommandé à la chute des pétales à l'aide de :

azinphos 50 g MA/HL, lindane 20 g MA/HL, malathion 75 g MA/HL

parathion éthyl 20 g MA/HL ou méthyl 25 g MA/HL, phosalone 60 g MA/HL.

ARAIGNEES ROUGES

Ces ravageurs sont signalés actuellement. Une intervention est recommandée, après repérage important des formes mobiles.

Le produit à base de Tetrasul (Animert), classé comme "non dangereux pour les abeilles" est recommandé, par suite de son mode d'action, agissant à la fois sur les larves et les oeufs prêts à éclore,

ou bien à l'aide de dicofol (Kelthane) sous forme de poudre mouillable.

PUCERONS

Effectuer le traitement après repérage des colonies, si possible après floraison.

N.B. Attention aux dangers de russeting avec les formulations à base d'émulsions surtout en mélange avec d'autres matières actives.

LE CHEF DE CIRCONSCRIPTION,

V. LAGAUE

Tirage du 22 Avril 1976

L'INGENIEUR,

M. TISSOT

- 1.475 exemplaires

Imprimerie de la Station d'Alertes Agricoles
Place Cgaptal - MONTPELLIER -

N° CPP 531 AD

Le Directeur,

P. JOURNET